

S--023	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	ベバシズマブ+トリフルリジン+チピラシル療法(Bev+TAS102)	28日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	...	6	...	8	...	13	...	15	...	28	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング								プライミング			キープ用
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	90分*								90分*			
3	トリフルリジン+チピラシル錠	下記参照	経口		夕		朝			夕		朝			

※ ベバシズマブは、2回目60分、3回目以降30分で投与可

トリフルリジン+チピラシル錠は、Day1の夕食後より、Day6の朝食後まで服用し、その後2日休薬  
さらに、Day8の夕食後より、Day13の朝食後まで服用し、その後16日休薬

体表面積(m <sup>2</sup> )	トリフルリジン+チピラシル(mg/day)
<1.07	1回35mg 1日2回
1.07-1.23	1回40mg 1日2回
1.23-1.38	1回45mg 1日2回
1.38-1.53	1回50mg 1日2回
1.53-1.69	1回55mg 1日2回
1.69-1.84	1回60mg 1日2回
1.84-1.99	1回65mg 1日2回
1.99-2.15	1回70mg 1日2回
2.15<	1回75mg 1日2回