

| | | |
|--------|---|--------|
| S--028 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
| 大腸がん | セツキシマブ+カペシタビン+オキサリプラチン療法 (bi-Cet+CapeOX) | 14日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | ... | 8 | ... | 14 | 備考 |
|----|---|--|------|--------|-----|---|-----|----|-------|
| 1 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | プライミング | | | | | キープ用 |
| 2 | デキサメタゾン ファモチジン d-カルシウムトリスリン酸塩 パロノセトロンバッグ | 13.2mg 20mg 5mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | |
| 3 | セツキシマブ* 生理食塩液 | 500mg/m ² 500mL | 点滴静注 | 2時間 | | | | | |
| 4 | オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液 | 85mg/m ² 1.65mg 500mL | 点滴静注 | 2時間 | | | | | 血管炎予防 |
| 5 | カペシタビン錠 | 2000mg/m ² | 経口 | | 夕 | | 朝 | | |

※ セツキシマブは、初回のみ投与後1時間アレルギー経過観察時間を設ける