

SC-033	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	ラムシルマブ+イリノテカン+フルオロウラシル療法 (RAM+FOLFIRI)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					キープ用
2	デキサメタゾン d-カルシウムトリスリン酸塩 パロノセトロンバッグ	13.2mg 5mg 50mL	点滴静注	30分					
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開滴下					フラッシュ用
4	ラムシルマブ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	1時間					
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開滴下					フラッシュ用
6	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					6と7は同時投与
7	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					
8	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	点滴静注	全開滴下					
9	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 120mL*	点滴静注		46時間				

※ Rp9)は全量で120mLになるように調製