

| | | |
|--------|--|--------|
| SC-040 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
| 大腸がん | セツキシマブ+イリノテカン+フルオロウラシル療法 (bi-Cet+FOLFIRI) | 14日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | ... | 14 | 備考 |
|----|---|---------------------------------|------|--------|------|---|-----|----|----------|
| 1 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | プライミング | | | | | キープ用 |
| 2 | デキサメタゾン d-カルシウムトリスリン酸塩 パロノセトロンバッグ | 13.2mg 5mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | |
| 3 | セツキシマブ* 生理食塩液 | 500mg/m ² 500mL | 点滴静注 | 2時間 | | | | | |
| 4 | レボホリナート 5%ブドウ糖液 | 200mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 2時間 | | | | | 4と5は同時投与 |
| 5 | イリノテカン 5%ブドウ糖液 | 150mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 2時間 | | | | | |
| 6 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 400mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 全開滴下 | | | | | |
| 7 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2400mg/m ² 120mL* | 点滴静注 | | 46時間 | | | | |

※ セツキシマブは、初回のみ投与後1時間アレルギー経過観察時間を設ける

※ Rp7)は全量で120mLになるように調製