

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| S--020 | レジメン名称(略語)                                | 1コース期間 |
| 胃がん    | トラスツズマブ+カペシタビン+オキサリプラチン療法<br>(TZB+CapeOX) | 21日間   |

| No | 医薬品名   | 投与量                                     | 投与方法 | 1      | … | 15 | … | 21 | 備考    |
|----|--|---|------|--------|---|----|---|----|-------|
| 1  | 生理食塩液  | 100mL                                   | 点滴静注 | プライミング |   |    |   |    | キープ用  |
| 2  | デキサメタゾン<br>ファモチジン<br>d-カルシウムリン酸塩<br>パロノセトロンバッグ | 13.2mg<br>20mg<br>5mg<br>50mL           | 点滴静注 | 30分    |   |    |   |    |       |
| 3  | トラスツズマブ<br>生理食塩液                               | 8mg/kg*<br>250mL                        | 点滴静注 | 90分*   |   |    |   |    |       |
| 4  | オキサリプラチン<br>デキサメタゾン<br>5%ブドウ糖液                 | 130mg/m <sup>2</sup><br>1.65mg<br>500mL | 点滴静注 | 2時間    |   |    |   |    | 血管炎予防 |
| 5  | カペシタビン錠  | 2000mg/m <sup>2</sup>                   | 経口   |        | 夕 |    | 朝 |    |       |

※ トラスツズマブは、初回8mg/kgで投与し、2回目以降は6mg/kgで投与を行う

※ トラスツズマブは、初回90分で投与し、2回目以降は30分まで短縮できる

