

SG-001	レジメン名称(略語)	1コース期間
胃がん	エスワン+シスプラチン療法(S-1+CDDP)	35日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	...	7	8	9	10	...	22	...	35	備考
1	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液	1000mL	点滴静注			4時間								
2	生理食塩液	100mL	点滴静注				プライミング							キープ用
3	デキサメタゾン ホスネツピタント グラニセトロンバッグ(1mg)	6.6mg 235mg 50mL	点滴静注				30分							
4	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注				2時間							
5	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド	1500mL 20mg	点滴静注				6時間							メトクロプラミドは、 1本目と3本目の点滴に混注
6	1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド	1000mL 20mg	点滴静注					4時間						
7	エスワン錠		経口		夕						朝			

エスワンは、Day1の夕食後より、Day22の朝食後まで服用し、その後2週間休薬

体表面積(m <sup>2</sup> )	エスワン(mg/day)
<1.25	1回40mg 1日2回
1.25-1.5	1回50mg 1日2回
>1.5	1回60mg 1日2回

腎機能により、減量を行う