

| | | |
|--------|--|--------|
| SG-019 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
| 胃がん | トラスツズマブ+カペシタビン+シスプラチン療法 (TZB+Cape+CDDP) | 21日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | ... | 16 | ... | 21 | 備考 |
|----|--|------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|----|-----|----|-----------------------------|
| 1 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | 1000mL | 点滴静注 | 4時間 | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | | プライミング | | | | | | キープ用 |
| 3 | デキサメタゾン ホスネツピタント グラニセトロンバッグ(1mg) | 6.6mg 235mg 50mL | 点滴静注 | | 30分 | | | | | | |
| 4 | トラスツズマブ 生理食塩液 | 8mg/kg* 250mL | 点滴静注 | | 90分* | | | | | | |
| 5 | シスプラチン 生理食塩液 | 80mg/m ² 500mL | 点滴静注 | | 2時間 | | | | | | |
| 6 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド | 1500mL 20mg | 点滴静注 | | 6時間 | | | | | | メトクロプラミドは、 1本目と3本目の点滴に混注 |
| 7 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド | 1000mL 20mg | 点滴静注 | | | 4時間 | | | | | |
| 8 | カペシタビン錠 | 2000mg/m ² | 経口 | | | 夕 | | 朝 | | | |

※ トラスツズマブは、初回8mg/kgで投与し、2回目以降は6mg/kgで投与を行う

※ トラスツズマブは、初回90分で投与し、2回目以降は30分まで短縮できる