

IL-029	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	エスワン+シスプラチン療法(S-1+CDDP)	28日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	...	8	9	10	11	...	21	...	28	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注			プライミング								キープ用
2	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注			30分								
3	補正用1モル塩化カリウム液 硫酸マグネシウム注射液 電解質輸液(開始液)	10mL 8mL 500mL	点滴静注			1時間								
4	浸透圧利尿剤	300mL	点滴静注			45分								
5	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	点滴静注			1時間								
6	補正用1モル塩化カリウム液 電解質輸液(開始液)	10mL 500mL	点滴静注			1時間								
7	アプレピタントカプセル		経口			点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg						
8	デキサメタゾン錠	1回4mg 1日2回	経口				朝・昼後	朝・昼後	朝・昼後					
9	エスワン錠		経口		夕						朝			

エスワンは、Day1の夕食後より、Day21の朝食後まで服用し、その後1週間休薬

体表面積(m ²)	エスワン(mg/day)
<1.25	1回40mg 1日2回
1.25-1.5	1回50mg 1日2回
>1.5	1回60mg 1日2回

腎機能により、減量を行う