

IL-047	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+カルボプラチン療法 (NIVO+IPI+PEM+CBDCA)	42日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	22	23	24	...	42	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				プライミング					キープ用
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg 100mL	点滴静注	30分				30分					
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分									経過観察用
4	イピリムマブ 生理食塩液	1mg/kg 20mL	点滴静注	30分									
5	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注	30分				30分					
6	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分				10分					
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=6 250mL	点滴静注	1時間				1時間					
8	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg		点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg			
9	シアノコバラミン注	1000μg	筋注	7日以上前から、9週ごと 投与中止後22日目まで									
10	複合ビタミン剤(葉酸として)	0.5mg	経口	7日以上前から、朝食後に服用 投与中止後22日目まで									