

IL-048	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+ペメトレキセド+シスプラチン療法(NIVO+IPI+PEM+CDDP)	42日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	...	22	23	24	25	...	42	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					プライミング						キープ用
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg 100mL	点滴静注	30分					30分						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分											経過観察用
4	イピリムマブ 生理食塩液	1mg/kg 20mL	点滴静注	30分											
5	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注	30分					30分						
6	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分					10分						
7	補正用1モル塩化カリウム液 硫酸マグネシウム注射液 電解質輸液(開始液)	10mL 8mL 500mL	点滴静注	1時間					1時間						
8	浸透圧利尿剤	300mL	点滴静注	45分					45分						
9	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間					1時間						
10	補正用1モル塩化カリウム液 電解質輸液(開始液)	10mL 500mL	点滴静注	1時間					1時間						
11	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg			点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg				
12	デキサメタゾン錠	1回4mg 1日2回	経口		朝・昼後	朝・昼後	朝・昼後			朝・昼後	朝・昼後	朝・昼後			
13	シアノコバラミン注	1000μg	筋注	7日以上前から、9週ごと 投与中止後22日目まで											
14	複合ビタミン剤(葉酸として)	0.5mg	経口	7日以上前から、朝食後に服用 投与中止後22日目まで											