IL-059	-059 レジメン名称(略語)					
非小細胞肺がん	ニボルマブ+ゲムシタビンシスプラチン療法(NIVO+GEM+CDDP)	21日間				

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	• • •	8	• • •	21	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					プライミング			キープ用
2	ニボルマブ	360mg	点滴静注	30分								
	生理食塩液	100mL										
3	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分								
	パロノセトロンバッグ	50mL										
4	デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注						30分			
	生理食塩液	50mL							3075			
5	ゲムシタビン	1000mg/mੈ	点滴静注	30分					30分			
	5%ブドウ糖液	100mL	二、一、一、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二						3075			
	補正用1モル塩化カリウム液	10mL		1時間								
	硫酸マグネシウム注射液	8mL	点滴静注									
	電解質輸液(開始液)	500mL										
7	浸透圧利尿剤	300mL	点滴静注	45分								
8	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間								
	生理食塩液	250mL										
9	補正用1モル塩化カリウム液	10mL	点滴静注	1時間								
	電解質輸液(開始液)	500mL										
10	アプレピタントカプセル		経口	点滴前	朝食後	朝食後						
				125mg	80mg	80mg						
11	デキサメタゾン錠	1回4mg 1日2回	経口		朝·昼後	朝·昼後	朝·昼後					