

IL-061	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	デュルバルマブ+トレメリムマブ+ペメトレキセド+シスプラチン療法 (DUR+TRE+PEM+CDDP)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	...	21	備考	
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング						キープ用	
2	トレメリムマブ 生理食塩液	75mg 100mL	点滴静注	1時間							
3	生理食塩液	100mL	点滴静注	30分						経過観察用	
4	デュルバルマブ 生理食塩液	1500mg* 100mL	点滴静注	1時間							
5	生理食塩液	100mL	点滴静注	30分						経過観察用	
6	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注	30分							
7	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	10分							
8	補正用1モル塩化カリウム液 硫酸マグネシウム注射液 電解質輸液（開始液）	10mL 8mL 500mL	点滴静注	1時間							
9	浸透圧利尿剤	300mL	点滴静注	45分							
10	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	1時間							
11	補正用1モル塩化カリウム液 電解質輸液（開始液）	10mL 500mL	点滴静注	1時間							
12	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg					
13	デキサメタゾン錠	1回4mg 1日2回	経口		朝・昼後	朝・昼後	朝・昼後				
14	シアノコバラミン注	1000μg	筋注	7日以上前から、9週ごと 投与中止後22日目まで							
15	複合ビタミン剤(葉酸として)	0.5mg	経口	7日以上前から、朝食後に服用 投与中止後22日目まで							

※ デュルバルマブは、体重30kg以下の場合は、20mg/kgとする