

| | | |
|--------|-------------------------------------|--------|
| IG-020 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
| 胃がん | トラスツズマブ+エスワン+シスプラチン療法(TZB+S-1+CDDP) | 21日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | ... | 16 | ... | 21 | 備考 |
|----|-----------------------------------|------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|----|-----|----|-----------------------------|
| 1 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | 1000mL | 点滴静注 | 4時間 | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | | プライミング | | | | | | キープ用 |
| 3 | デキサメタゾン ホスネツピタント パロノセトロンバッグ | 6.6mg 235mg 50mL | 点滴静注 | | 30分 | | | | | | |
| 4 | トラスツズマブ 生理食塩液 | 8mg/kg* 250mL | 点滴静注 | | 90分* | | | | | | |
| 5 | シスプラチン 生理食塩液 | 60mg/m ² 500mL | 点滴静注 | | 2時間 | | | | | | |
| 6 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド | 1500mL 20mg | 点滴静注 | | 6時間 | | | | | | メトクロプラミドは、 1本目と3本目の点滴に混注 |
| 7 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 メトクロプラミド | 1000mL 20mg | 点滴静注 | | | 4時間 | | | | | |
| 8 | エスワン錠 | | 経口 | | 夕 | | | 朝 | | | |

エスワンは、Day2の夕食後より、Day16の朝食後まで服用し、その後1週間休薬

| 体表面積(m ²) | エスワン(mg/day) |
|-----------------------|--------------|
| <1.25 | 1回40mg 1日2回 |
| 1.25-1.5 | 1回50mg 1日2回 |
| >1.5 | 1回60mg 1日2回 |

腎機能により、減量を行う

- ※ トラスツズマブは、初回8mg/kgで投与し、2回目以降は6mg/kgで投与を行う
- ※ トラスツズマブは、初回90分で投与し、2回目以降は30分まで短縮できる