

IG-021	レジメン名称(略語)	1コース期間
胃がん	ゾルベツキシマブ+オキサリプラチン+フルオロウラシル療法 (ZOL+mFOLFOX6)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					キープ用
2	デキサメタゾン ファモチジン ヒドロキシジン ホスネツピタント パロノセトロンバッグ	6.6mg 20mg 25mg 235mg 50mL	点滴静注	30分					
3	ゾルベツキシマブ 生理食塩液	800mg/m ² 2mg/mL*	点滴静注	4.5時間					
4	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					4と5は同時投与
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					
6	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	点滴静注	全開滴下					
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 120mL*	点滴静注		46時間				

- ※ ゾルベツキシマブは、2mg/mLの濃度となるように調製する
投与速度は、100mg/m²/hrで1時間投与し、その後200mg/m²/hrで投与を行う
2コース目以降は、400mg/m²とし、50mg/m²/hrで1時間投与、その後100mg/m²/hrで投与を行う
- ※ Rp7)は全量で120mLになるように調製