

IC-015	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	パニツムマブ+オキサリプラチン+フルオロウラシル療法 (Pani+FOLFOX4)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	...	14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				キープ用
2	パニツムマブ 生理食塩液	6mg/kg 100mL	点滴静注	60分				
3	デキサメタゾン ファモチジン d-クルフェニミンマレイン酸塩 パロノセトロンバッグ	13.2mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分				
4	レボホリナート 5%ブドウ糖液	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間	2時間			4と5は同時投与
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	2時間				
6	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	全開滴下	全開滴下			
7	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				キープ用
8	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング				キープ用
9	フルオロウラシル L-乳酸リンゲル液	600mg/m <sup>2</sup> 1000mL	点滴静注	22時間	22時間			