GO-012	レジメン名称(略語)	1コース期間				
卵巣がん	ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン療法(BLM+ETP+CDDP)	21日間				

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	• • •	9	• • •	16	• • •	21	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング	プライミング	プライミング	プライミング	プライミング			プライミング		プライミング			キープ用
2	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間								
3	デキサメタゾン グラニセトロンバッグ(1mg)	6.6mg 50mL	点滴静注	30分												
4	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	6.6mg 50mL	点滴静注		30分											
5	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注			30分	30分	30分	30分							
6	グラニセトロンバッグ(1mg)	50mL	点滴静注								30分		30分			
7	ブレオマイシン 生理食塩液	30mg 100mL	点滴静注		30分						30分		30分			
8	エトポシド 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間								
9	シスプラチン 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間								
10	フロセミド 5%マルトース加乳酸リンゲル液	20mg 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間								
11	メトクロプラミド 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液	10mg 500mL	点滴静注	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間							
12	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg										