

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| G--011 | レジメン名称(略語)                                  | 1コース期間 |
| 子宮頸がん  | ベバシズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン療法<br>(Bev+PTX+CBDCA) | 21日間   |

| No | 医薬品名   | 投与量                           | 投与方法 | 1      | … | 21 | 備考   |
|----|--|-------------------------------|------|--------|---|----|------|
| 1  | 生理食塩液  | 100mL                         | 点滴静注 | プライミング |   |    | キープ用 |
| 2  | デキサメタゾン<br>ファモチジン<br>d-カルシウムリン酸塩<br>パロノセトロンバッグ | 19.8mg<br>20mg<br>5mg<br>50mL | 点滴静注 | 30分    |   |    |      |
| 3  | ベバシズマブ<br>生理食塩液                                | 15mg/kg<br>100mL              | 点滴静注 | 90分*   |   |    |      |
| 4  | パクリタキセル<br>5%ブドウ糖液                             | 180mg/m <sup>2</sup><br>500mL | 点滴静注 | 3時間    |   |    |      |
| 5  | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖液                             | AUC=5<br>250mL                | 点滴静注 | 1時間    |   |    |      |

※ ベバシズマブは、2回目60分、3回目以降30分で投与可