

GTN-001	レジメン名称(略語)	1コース期間
絨毛がん	エトボシド+メソトレキセート+アクチノマイシンド/シクロホスファミド+ビンクリスチン療法 (ETP+MTX+ACD/CPA+VCR)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	8	9	10	11	...	14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング	プライミング			プライミング						キープ用
2	ブドウ糖-電解質液 (維持液)	500mL	点滴静注		1時間									
3	デキサメタゾン パロノセトロンバック	6.6mg 50mL	点滴静注	30分				30分						
4	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注		30分									
5	エトボシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	2時間									
6	アクチノマイシンド 注射用蒸留水 生理食塩液	0.5mg 1mL 50mL	点滴静注	全開滴下	全開滴下									
7	メソトレキセート 生理食塩液	300mg/m ² 500mL	点滴静注	12時間										
8	ブドウ糖-電解質液 (維持液)	500mL	点滴静注		1時間									
9	ホリナートカルシウム* 生理食塩液	15mg 50mL			全開滴下	全開滴下								
10	ホリナートカルシウム* 生理食塩液	15mg 50mL			全開滴下	全開滴下								
11	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg								
12	シクロホスファミド 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	点滴静注					1時間						
13	ビンクリスチン 生理食塩液	1mg/m ² 50mL	点滴静注					全開滴下						
14	フィルグラスチム*	75μg	皮下注射						●	●	●			

※ ホリナートカルシウムは、メソトレキセート開始後24時間から開始し、12時間毎に4回投与を行う

※ フィルグラスチムは、骨髄抑制を予防するため、一次予防として使用する