| G--005 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
|---|---|---|
| 子宮頚がん | イリノテカン+ネダプラチン療法(IRI+CDGP) | 28日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | ・・・ | 8 | ・・・ | 15 | ・・・ | 22 | ・・・ | 28 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | プライミング | | プライミング | | プライミング | | | | | キープ用 |
| 2 | デキサメタゾン<br>パロノセトロンバッグ | 13.2mg<br>50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | | | |
| 3 | デキサメタゾン<br>グラニセトロンバッグ(1mg) | 13.2mg<br>50mL | 点滴静注 | | | 30分 | | 30分 | | | | | |
| 4 | イリノテカン<br>5%ブドウ糖液 | 60mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 90分 | | 90分 | | 90分 | | | | | |
| 5 | ネダプラチン<br>生理食塩液 | 80mg/㎡<br>500mL | 点滴静注 | 90分 | | | | | | | | | |
| 6 | 1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | 1000mL | 点滴静注 | 4時間 | | | | | | | | | |