

| | | |
|--------|--|--------|
| GO-023 | レジメン名称(略語) | 1コース期間 |
| 卵巣がん | ベバシズマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン療法 (Bev+GEM+CBDCA) | 21日間 |

| No | 医薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 21 | 備考 |
|----|----------------------------|--------------------------------|------|--------|-----|--------|-----|----|-----|----|------|
| 1 | 5%ブドウ糖液 | 100mL | 点滴静注 | プライミング | | プライミング | | | | | キープ用 |
| 2 | デキサメタゾン パロノセトロン | 13.2mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | |
| 3 | デキサメタゾン グラニセトロンバッグ(1mg) | 6.6mg 50mL | 点滴静注 | | | 30分 | | | | | |
| 4 | ベバシズマブ 生理食塩液 | 15mg/kg 100mL | 点滴静注 | 90分* | | | | | | | |
| 5 | ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 | 1000mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 30分 | | 30分 | | | | | |
| 6 | カルボプラチン 5%ブドウ糖液 | AUC=4 250mL | 点滴静注 | 1時間 | | | | | | | |

※ ベバシズマブは、2回目60分、3回目以降30分で投与可