

IC-020-1	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	(初回用) セツキシマブ+イリノテカン+フルオロウラシル療法 (bi-Cet+FOLFIRI)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	…			14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング							キープ用
2	デキサメタゾン d-カルシウムトリスリン酸塩 パロノセトロンバッグ	13.2mg 5mg 50mL	点滴静注	30分							
3	セツキシマブ* 生理食塩液	500mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間							
4	生理食塩液	100mL	点滴静注	1時間							経過観察用
5	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間							5と6は同時投与
6	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間							
7	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	点滴静注	全開滴下							
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 120mL *	点滴静注		46時間						

※ セツキシマブは、初回のみ投与後1時間アレルギー経過観察時間を設ける

※ Rp8)は全量で120mLになるように調製