

IG-023-2	レジメン名称(略語)	1コース期間
胃がん	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+エスワン +オキサリプラチン療法(Pem+TZB+SOX) (2回目以降用)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	...	15	...	21	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					キープ用
2	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg 100mL	点滴静注	30分					
3	トラスツズマブ 生理食塩液	6mg/kg* 250mL	点滴静注	90分*					
4	デキサメタゾン d-グルクロン酸塩 ファモチジン ホスネツピタント パロノセトロンバッグ	6.6mg 5mg 20mg 235mg 50mL	点滴静注	30分					
5	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 1.65mg 500mL	点滴静注	2時間					血管炎予防
6	エスワン錠		経口	夕	朝				

エスワンは、Day1の夕食後より、Day15の朝食後まで服用し、その後1週間休薬

体表面積(m ²)	エスワン(mg/day)
<1.25	1回40mg 1日2回
1.25-1.5	1回50mg 1日2回
>1.5	1回60mg 1日2回

腎機能により、減量を行う

※ トラスツズマブは、初回8mg/kgで投与し、2回目以降は6mg/kgで投与を行う

※ トラスツズマブは、初回90分で投与し、2回目以降は30分まで短縮できる