

IL-077	レジメン名称(略語)	1コース期間
非小細胞肺癌	デュルバルマブ+ペメトレキセド+シスプラチン療法(DUR+PEM+CDDP)	21日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	...	21	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング						キープ用
2	デュルバルマブ 生理食塩液	1500mg* 100mL	点滴静注	1時間						
3	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9mg 50mL	点滴静注	30分						
4	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分						
5	補正用1モル塩化カリウム液 硫酸マグネシウム注射液 電解質輸液（開始液）	10mL 8mL 500mL	点滴静注	1時間						
6	浸透圧利尿剤	300mL	点滴静注	45分						
7	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間						
8	補正用1モル塩化カリウム液 電解質輸液（開始液）	10mL 500mL	点滴静注	1時間						
9	アプレピタントカプセル		経口	点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg				
10	デキサメタゾン錠	1回4mg 1日2回	経口		朝・昼後	朝・昼後	朝・昼後			
11	シアノコバラミン注	1000μg	筋注	7日以上前から、9週ごと 投与中止後22日目まで						
12	複合ビタミン剤(葉酸として)	0.5mg	経口	7日以上前から、朝食後に服用 投与中止後22日目まで						

※ デュルバルマブは、体重30kg以下の場合は、20mg/kgとする