

|        |                                             |        |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| IL-080 | レジメン名称(略語)                                  | 1コース期間 |
| 非小細胞肺癌 | デュルバルマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン療法<br>(DUR+GEM+CBDCA) | 21日間   |

| No | 医薬品名                  | 投与量                            | 投与方法 | 1            | 2           | 3           | ... | 8      | ... | 21 | 備考   |
|----|-----------------------|--------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|-----|--------|-----|----|------|
| 1  | 生理食塩液                 | 100mL                          | 点滴静注 | プライミング       |             |             |     | プライミング |     |    | キープ用 |
| 2  | デュルバルマブ<br>生理食塩液      | 1500mg*<br>100mL               | 点滴静注 | 1時間          |             |             |     |        |     |    |      |
| 3  | デキサメタゾン<br>パロノセトロンバッグ | 9.9mg<br>50mL                  | 点滴静注 | 30分          |             |             |     |        |     |    |      |
| 4  | デキサメタゾン<br>生理食塩液      | 6.6mg<br>50mL                  | 点滴静注 |              |             |             |     | 30分    |     |    |      |
| 5  | ゲムシタビン<br>5%ブドウ糖液     | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴静注 | 30分          |             |             |     | 30分    |     |    |      |
| 6  | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖液    | AUC=5<br>250mL                 | 点滴静注 | 1時間          |             |             |     |        |     |    |      |
| 7  | アプレピタントカプセル           |                                | 経口   | 点滴前<br>125mg | 朝食後<br>80mg | 朝食後<br>80mg |     |        |     |    |      |

※ デュルバルマブは、体重30kg以下の場合は、20mg/kgとする