

SC-030	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	パニツムマブ+オキサリプラチン+フルオロウラシル療法 (Pani+FOLFOX4)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	14	備考
1	L-乳酸リンゲル液	1000mL	点滴静注	6時間					
2	生理食塩液	100mL	点滴静注		プライミング				キープ用
3	パニツムマブ 生理食塩液	6mg/kg 100mL	点滴静注		60分				
4	デキサメタゾン ファモチジン d-カルシエトリン酸塩 パロノセトロンバッグ	13.2mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注		30分				
5	レボホリナート 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 250mL	点滴静注		2時間	2時間			5と6は同時投与
6	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注		2時間				
7	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 100mL	点滴静注		全開滴下	全開滴下			
8	フルオロウラシル L-乳酸リンゲル液	600mg/m ² 1000mL	点滴静注		22時間	22時間			
9	生理食塩液	50mL	点滴静注			全開滴下			フラッシュ用