

SC-039-1	レジメン名称(略語)	1コース期間
大腸がん	ベバシズマブ+オキサリプラチン+イリノテカン+フルオロウラシル療法 (Bev+mFOLFOXIRI)	14日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	...	14	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					キープ用
2	デキサメタゾン ファモチジン d-クルトエニミドリン酸塩 ホスネツピタント パロノセトロンバッグ	9.9mg 20mg 5mg 235mg 50mL	点滴静注	30分					
3	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	90分*					
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					
5	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					5と6は同時投与
6	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間					
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 120mL*	点滴静注		46時間				

※ ベバシズマブは、2回目60分、3回目以降30分で投与可

※ Rp7)は全量で120mLになるように調製