

UB-001-2	レジメン名称(略語)	1コース期間
尿路上皮がん	メトトレキサート+ビンブラスチン+ドキシソルピシン+シスプラチン療法 (MTX+VBL+ADR+CDDP)	28日間

No	医薬品名	投与量	投与方法	1	2	3	4	...	15	...	22	...	28	備考
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	プライミング					プライミング		プライミング			キープ用
2	メトトレキサート 生理食塩液	30mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注	全開滴下					全開滴下		全開滴下			
3	乳酸リンゲル液	1000mL	点滴静注	4時間										
4	フロセミド 乳酸リンゲル液	20mg 500mL	点滴静注		2時間	2時間								
5	デキサメタゾン グラニセトロンバッグ(1mg)	6.6mg 50mL	点滴静注		30分	30分								
6	ビンブラスチン 生理食塩液	3mg/m <sup>2</sup> 30mL	点滴静注		全開滴下				全開滴下		全開滴下			
7	ドキシソルピシン 生理食塩液	30mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴静注		全開滴下									
8	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注		3時間									
9	乳酸リンゲル液	1500mL	点滴静注		6時間									
10	乳酸リンゲル液	1000mL	点滴静注			4時間			4時間		4時間			
11	アプレピタントカプセル		経口		点滴前 125mg	朝食後 80mg	朝食後 80mg							